

PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA

Nota informativa per pazienti

Cognome e Nome

Esame prenotato per il giorno..... alle ore.....

Nell' impossibilità di presentarsi all'appuntamento telefonare al n° 0426 360206.

Il paziente è pregato di presentarsi, il giorno dell'esame, con la seguente documentazione:

- richiesta del medico curante
- eventuale elenco delle terapie in atto (medicine che sta assumendo)
- eventuale documentazione clinica (referti endoscopici o radiologici precedenti)
- eventuale elettrocardiogramma (solo se recente)
- eventuali esami del sangue (emocromo, PT, PTT).

Dopo l'esame il paziente dovrà essere accompagnato e non potrà guidare alcun veicolo.

PER LA PULIZIA INTESTINALE UTILIZZARE IL PURGANTE LOVOL-DYL + LOVOL-ESSE

Avvertenze particolari:

- Rivolgersi al proprio medico di base se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti/antiaggreganti (Sintrom o Coumadin, Pradaxa, Plavix, etc.) per valutare se continuare l'assunzione o procedere alla loro sospensione, da effettuare almeno 5 giorni prima dell'indagine e la loro sostituzione con Eparina BPM s.c.
- Rivolgersi al proprio medico di base se si è diabetici in trattamento con insulina o altri farmaci, per una eventuale rivalutazione di dosaggio o terapia.


Cosa fare per la preparazione

Tre giorni prima dell'esame iniziare una dieta priva di scorie (non assumere frutta, verdura, cibi integrali).

Mantenere un intervallo di almeno 1-2 ore tra l'assunzione dei farmaci per via orale e l'inizio della preparazione. Al termine della preparazione è possibile assumere la terapia orale abituale.

Il contenuto di una busta di Lovol-Esse va disciolto in 500 ml di acqua. Ripetere l'operazione per le rimanenti tre buste.

E' possibile raffreddare la soluzione per renderla più gradevole.

	Servizio di Endoscopia Digestiva Preparazione intestinale alla colonscopia standard	Mod. 3 Reg01/SED
		Rev. 3
		Data 15/05/2015
		Pagina 2 di 2

PREPARAZIONE INTESTINALE CON LOVOL-DYL + LOVOL-ESSE

I pomeriggio precedente il giorno dell'esame assumere:

dalle ore 12.00 assumere solo liquidi.

alle ore 15.00 3 compresse di Lovol-dyl da 5 mg.

Se si assumono lassativi (senna, cascara, bisacolide, picosolfato ecc.) la dose deve essere aumentata a 4 compresse.

alle ore 19.00 bere la soluzione Lovol-Esse (**sciogliere ogni busta di Lovol-Esse in 500 ml di acqua**). Bere 250 ml (un bicchiere grande) ad intervalli di 15-20 minuti. L'intera soluzione (2 litri) viene assunta in circa 2-3 ore.

E' possibile bere acqua non gassata, tè, tisane anche zuccherate sino a 6 ore prima dell'esame (a partire da 6 ore prima dell'esame osservare digiuno assoluto sia da cibi solidi che liquidi).

Note:

- Non assumere farmaci da un'ora prima sino alla fine della preparazione.
- L'apporto di acqua non gassata è libero. Salvo diversa indicazione medica astenersi dall'assunzione di liquidi almeno 6 ore prima dell'esame.
- Può comparire gonfiore o distensione addominale prima dell' evacuazione. Se il gonfiore diventasse fastidioso si consiglia di interrompere temporaneamente l'assunzione della soluzione o bere ciascuna porzione (250 ml) ad intervalli maggiori (ad esempio ogni 30 minuti) finché i sintomi non scompaiono.

Durante la preparazione intestinale è opportuno tenersi vicino ad un bagno. Lovol-Esse determina la comparsa di evacuazioni liquide, generalmente dopo circa 1 ora dall'inizio dell'assunzione della soluzione.