

L'esame è fissato è per il..... alle ore.....

Preparazione eseguita con SELG 1000

IL POMERIGGIO CHE PRECEDE L'ESAME

La dose consigliata per il lavaggio intestinale è di 4 litri.

Prima di iniziare ad assumere il preparato bisogna essere a digiuno da almeno 3 o 4 ore.

Sciogliere 4 buste da 70 g in 4 litri di acqua da assumere in un'unica dose oppure si possono frazionare in due dosi, 2 litri la mattina precedente l'esame e 2 litri il pomeriggio.

Il ritmo di assunzione è di un bicchiere pieno ogni 15 minuti fino da esaurimento dei 4 litri. E' preferibile che ogni singola dose venga ingerita rapidamente.

La prima evacuazione si verifica di regola 90 minuti dopo l'inizio della somministrazione. Si deve continuare a bere finché l'efflusso rettale sarà limpido.

Da 2 ore prima dell'assunzione fino all'esecuzione dell'esame non vanno ingeriti cibi solidi, l'apporto di acqua è invece libero.

Raccomandiamo di:

- portare sempre, se possibile, i referti dei precedenti esami endoscopici e/o lettere di dimissioni di ricoveri precedenti. portare l'eventuale terapia che si sta assumendo a casa. Se si stanno assumendo farmaci chiedere consiglio al medico per valutare la continuazione o modificazione dell'assunzione (es. farmaci anticoagulanti come Sintrom e Coumadin) o Antiaggreganti (es. come cardioaspirin, aspirinetta, cardirene, ticlopidina) in tal caso si consiglia la sospensione almeno 5 giorni prima dell'indagine e la loro sostituzione con Eparina BPM s.c. (rivolgendovi al vostro medico di base). Non assumere altri medicinali per via orale fino ad un'ora dopo l'assunzione di SELG 1000 in quanto potrebbero essere eliminati dal tratto gastro-intestinale senza venire assorbiti.
- anche se a digiuno il giorno dell'esame vanno comunque assunti i farmaci che normalmente si prendono.
- poiché la colonscopia viene eseguita in sedazione **è necessario essere accompagnati ed è sconsigliato mettersi alla guida di autoveicoli dopo l'esame**