

 PORTO V I R O Casa di Cura Madonna della Salute	Servizio di Endoscopia Digestiva Preparazione intestinale alla colonscopia Alternativa 3	Mod 7 Reg 01/SED
		Rev. 1
		23/05/2016
		Pagina di 1/1

L'esame è fissato è per il..... alle ore.....

preparazione eseguita con Phospholax

esame al mattino (eseguito entro le ore 15.00):

il giorno che precede l'esame

- a colazione ed a pranzo: latte, thè, camomilla, ben zuccherati a volontà.
- alle ore 16.30, 2 buste di phospholax in un bicchiere di acqua. Nelle 2 ore successive bere 1 litro di liquidi (acqua, thè o camomilla).
- alle ore 20.00, 2 buste di **Phospholax** in un bicchiere d'acqua. Nelle 2 ore successive bere 1 litro di liquidi (acqua, thè o camomilla).

esame al pomeriggio (eseguito dopo le ore 15.00)

il giorno che precede l'esame

- a cena: latte, thè, camomilla, ecc. ben zuccherati, a volontà.

il giorno dell'esame

- alle ore 7.00 , 2 buste di Phospholax in un bicchiere d'acqua. Nelle 2 ore successive bere 1 litro di liquidi (acqua, thè o camomilla).
- alle ore 11.00 ,2 buste di Phospholax in un bicchiere di acqua. Nelle 2 ore successive bere 1 litro di liquidi (acqua, thè o camomilla).

Raccomandiamo di:

- portare sempre, se possibile, i referti dei precedenti esami endoscopici e/o lettere di dimissioni di ricoveri precedenti. portare l'eventuale terapia che si sta assumendo a casa Se si stanno assumendo farmaci chiedere consiglio al medico per valutare la continuazione o modificazione dell'assunzione (es. farmaci anticoagulanti come Sintrom e Coumadin) o Antiaggreganti (es. come cardioaspirin, aspirinetta, cardirene, ticlopidina) in tal caso si consiglia la sospensione almeno 5 giorni prima dell'indagine e la loro sostituzione con Eparina BPM s.c. (rivolgendovi al vostro medico di base). Non assumere altri medicinali per via orale fino ad un'ora dopo l'assunzione Phospholax in quanto potrebbero essere eliminati dal tratto gastro-intestinale senza venire assorbiti.
- anche se a digiuno il giorno dell'esame vanno comunque assunti i farmaci che normalmente si prendono.
- poiché la colonscopia viene eseguita in sedazione **è necessario essere accompagnati ed è sconsigliato mettersi alla guida di autoveicoli dopo l'esame.**